

历年常考点总结

- 1、结肠癌最早出现的临床症状是（**排便习惯和粪便性状的变化**）。
- 2、导致阑尾穿孔最主要的因素是（**阑尾腔阻塞**）。
- 3、诱发 DIC 最常见的病因为（**革兰氏阴性细菌感染**）。
- 4、心肌梗死 24 小时内并发急性左心衰时，最不宜用（**洋地黄**）。
- 5、硫酸镁中毒时最早出现的是（**膝反射消失**）。
- 6、治疗消化性溃疡患者上腹部疼痛效果最好的是（**质子泵抑制剂**）。
- 7、流行性乙型脑炎病变最轻微的部位是（**脊髓**）。
- 8、细菌性痢疾肠道病变最显著的部位是在（**乙状结肠和直肠**）。
- 9、早期诊断急性血源性骨髓炎最有价值的方法是（**局部分层穿刺**）。
- 10、恶性肿瘤种植性转移到盆腔，最多见的是（**胃癌**）。
- 11、颅内肿瘤中最多见的是（**神经上皮性肿瘤**）。
- 12、诊断急性胰腺炎最广泛应用的化验指标是（**血清淀粉酶**）。
- 13、合并双侧肾动脉狭窄的高血压患者降压不宜首选（**血管紧张素转换酶抑制剂**）。
- 14、休克监测最常用及最简便的监测方法是**尿量**。
- 15、低钾血症最早出现**肌无力**。
- 16、代酸最突出的症状是**呼吸深快**。
- 17、最能反映血浆渗透压的是**口渴**。
- 18、临床上最常见的酸碱平衡是**代酸**。
- 19、幽门梗阻最常见的酸碱平衡是**代碱**。
- 20、输血并发症最严重的是**溶血反应**。
- 21、外科最常见的休克：**低血容量性休克**。
- 22、失血性休克失血量最低为全血量的**20%**。
- 23、休克最基本措施为**补充血容量**。
- 24、破伤风最有效最可靠的方法是注射**破伤风类毒素**。
- 25、甲状腺手术后最危险的并发症：**呼吸困难和窒息**。
- 26、甲状腺危象预防最关键措施是**术前做好充分的准备**。



- 27、甲状腺癌中最差的为**未分化癌**。
- 28、急性乳腺炎最常见致病菌为**金黄色葡萄球菌**。
- 29、乳腺癌最常见的为**浸润性非特殊癌**。
- 30、乳腺癌最常见转移部位为**患侧腋窝下淋巴结**。
- 31、肋骨骨折最易发生的部位为第**4~7肋骨**。
- 32、肺癌最常见的是：**鳞癌**。
- 33、肺癌中预后最差的是**小细胞癌**。对放疗最敏感的是**小细胞癌**。
- 34、食管癌最好发的部位是**中段**。
- 35、食管癌最常见的是**鳞癌**。
- 36、继发性腹膜炎最常见的致病菌为**大肠杆菌**。
- 37、腹膜炎最主要症状是**腹痛**。
- 38、消化性溃疡并出血最常见部位 GU **胃小弯** DU **球部后壁**。
- 39、消化性溃疡穿孔最常见部位 GU **胃小弯** DU **急性，前壁。慢性，后壁**。
- 40、胃癌最好发部位：**胃窦**。最常见转移途径：**淋巴道**。
- 41、肠梗阻最常见是**粘连型**。治疗最关键措施是：**禁食和胃肠减压**。
- 42、急性阑尾炎最重要体征：**右下腹有明显固定压痛点**。
- 43、急性阑尾炎手术最常见并发症：**切口感染**。
- 44、结肠癌最常见的组织学类型：**腺癌**。最主要的转移方式：**淋巴道转移**。
- 45、直肠癌最好发部位是**壶腹部**。
- 46、开放性损伤最常见的是**肝破裂**。闭合性损伤最常见的是**脾破裂**。
- 47、门脉高压首先出现的是充血性**脾肿大**。
- 48、急性胆囊炎细菌感染最常见的是**大肠杆菌**。首选诊断方法是**B超**。
- 49、急性胰腺炎在我国最常见病因是**胆石症**、最常见并发症是**休克**。
- 50、为诊断胰腺坏死最佳方法是**CT**。
- 51、胰腺癌最常见为**导管细胞腺癌**。首发症状为**上腹痛**。
- 52、尿道损伤最常见症状为**尿道出血**，骑跨伤以**球部**多见。骨盆骨折以**膜部**多见。
- 53、肾结核最早出现**尿频**。
- 54、我国泌尿系统男性生殖系肿瘤最多发的是**膀胱肿瘤**。
- 55、髌关节脱位最常见为髌关节**后脱位**。

- 56、烧伤早期最需要的治疗为**补液**。
- 57、等渗性脱水首选**平衡盐液**。
- 58、高渗性脱水首选**5%GS**。
- 59、心功能不全急性失血首选**浓缩红细胞**。
- 60、甲危时甲状腺药首选**丙基硫氧嘧啶**（也是妊娠时首选）。
- 61、儿童腹股沟疝首选**单纯疝囊高位结扎术**。
- 62、循环骤停进行复苏时最有效的药物是：**肾上腺素**。
- 63、反复呕吐可导致电解质紊乱损失最多的是**Na+**。
- 64、最易导致低钾血症的是严重**肠痿**。
- 65、肠外营养最严重的技术并发症是**空气栓塞**。
- 66、多次输血而有发热的贫血病人选用**洗条红细胞**。
- 67、基础代谢率的计算公式最常用的是**脉率+脉压-111**。
- 68、对老年复发性腹股沟疝最理想的手术方式是**McVay法**。
- 69、绞窄性肠梗阻最易发生**代谢性酸中毒**。
- 70、导致粘连性肠梗阻最常见的原因是：**腹腔内手术**。
- 71、阑尾容易发生坏死的原因：阑尾**无侧支终末动脉**。
- 72、诊断急性阑尾炎最重要的是**转移性右下腹疼痛**。
- 73、诊断胆囊结石简单而可靠的方法是**B超**。
- 74、临床上最常见的尿结石是：**草酸盐结石**。
- 75、肾积水最理想的治疗是**去除病因**，保留患肾。
- 76、继发性精索静脉曲张最常见于：**肾癌**。
- 77、股骨颈骨折中预后最好的是：**基底骨折**。
- 78、最常发生先天性脱位的关节是：**髋关节**。
- 79、急性血源性骨髓炎的发病部位最常见于：**胫骨、股骨**。
- 80、中央型腰椎间盘突出症和马尾神经瘤最有意义的鉴别点是：**脊髓造影**。
- 81、正常人水的生理需要量为**2000-2500ml**。
- 82、每日最少尿量为**500-600ml**。
- 83、食管癌进食困难，高烧患者一般为**高渗性脱水**；急性肠梗阻为**等渗性脱水**；长期胃肠减压、呕吐腹泻为**低渗性脱水**。



- 84、口渴是高渗性脱水的主要症状。又称原发性脱水，治疗主要补充 5%GS 为主。
- 85、等渗性脱水是外科最常见的脱水类型，又称急性脱水。
- 86、低渗性脱水又称继发性脱水。治疗主要补充盐水为主。
- 87、大量失水患者出现休克，血压低可补充 3%氯化钠。
- 88、低钾血症患者心电图会出现特征性 U 波。低钾血症患者出现肌无力，腱反射减弱，心音低钝、腹胀等。
- 89、腹膜炎引起的肠梗阻为麻痹性肠梗阻。铅中毒引起痉挛性肠梗阻。肠系膜血栓形成引起的肠梗阻为绞窄性肠梗阻。
- 90、肠梗阻患者出现等渗性脱水、低钾血症、代谢性酸中毒。
- 91、肠梗阻患者出现腹膜刺激征提示绞窄性肠梗阻，需要急诊手术治疗。
- 92、小儿果酱样提示肠套叠。
- 93、阑尾炎典型症状为转移性右下腹疼痛。先开始于脐周或者上腹部，后转移至右下腹部。原因先因为内脏神经反射，后因壁层腹膜炎引起的躯体性疼痛。
- 94、阑尾炎穿孔手术后出现大便次数增加，里急后重，提示盆腔脓肿形成。
- 95、阑尾周围脓肿患者体温正常后三个月手术。
- 96、腹外疝最常见的内容物为小肠。腹股沟斜疝最为常见。股疝是最容易发生嵌顿的疝气。
- 97、疝气形成的主要原因是腹部有薄弱区或者腹部有缺损区。
- 98、疝气手术后 3 个月不能从事重体力劳动。
- 99、疝气手术预防阴囊水肿的方法是沙袋压迫伤口并托起阴囊。